



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Propolis Halspastillen

30 mg Lutschpastille

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren

Wirkstoff: Propolis (gepulvert)

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Propolis Halspastillen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Propolis Halspastillen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Propolis Halspastillen beachten?
3. Wie sind Propolis Halspastillen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Propolis Halspastillen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS SIND PROPOLIS HALSPASTILLEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Propolis Halspastillen sind ein pflanzliches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiet:** Zur unterstützenden Behandlung bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenbereich.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PROPOLIS HALSPASTILLEN BEACHTEN?

Propolis Halspastillen dürfen nicht eingenommen werden

- Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Propolis oder einem sonstigen Bestandteil der Propolis Halspastillen sollten Sie das Arzneimittel nicht anwenden. Das gilt auch, wenn Sie auf Zimt oder Perubalsam überempfindlich reagieren (Kreuzallergie) oder unter einer Bienenstichallergie leiden.
- Propolis Halspastillen enthält Menthol. Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie unter Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen, leiden.

## Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Propolis Halspastillen ist erforderlich:

### Kinder

- Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollen Propolis Halspastillen bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

## Bei Einnahme von Propolis Halspastillen mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Inkompatibilitäten sind nicht bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## Schwangerschaft und Stillzeit

### Schwangerschaft

Sie können Propolis Halspastillen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch in der Schwangerschaft nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen.

### Stillzeit

Sie können Propolis Halspastillen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch in der Stillzeit nach Rücksprache mit ihrem Arzt einnehmen.

## Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

- Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Propolis Halspastillen:

Dieses Arzneimittel enthält Isomalt. Bitte nehmen Sie Propolis Halspastillen daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.



### 3. WIE SIND PROPOLIS HALSPASTILLEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Propolis Halspastillen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre bei Erkältungsanzeichen alle 2–3 Stunden eine Propolis Halspastille langsam im Mund zergehen.

**Art der Anwendung:** Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum (Zergehen lassen im Mund).

**Dauer der Anwendung:** Das Medikament soll ohne ärztlichen Rat nicht längerfristig eingenommen werden. Die maximale Dosis beträgt 6 Lutschpastillen täglich.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Propolis Halspastillen zu stark oder zu schwach ist. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können Propolis Halspastillen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

|  |   |
|--|---|
| <b>Sehr häufig:</b><br>kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen  | <b>Häufig:</b><br>kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen                              |
| <b>Gelegentlich:</b><br>kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen  | <b>Selten:</b><br>kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen                            |
| <b>Sehr selten:</b><br>kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen | <b>Nicht bekannt:</b><br>Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar |

**Mögliche Nebenwirkungen:** Propolis kann nach der Anwendung auf der Haut sowie auf der Schleimhaut des Mund-, Hals- und Rachenraumes Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Die Häufigkeit, mit der diese Nebenwirkungen auftreten, ist nicht bekannt.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)  
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE SIND PROPOLIS HALSPASTILLEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

**Was Propolis Halspastillen enthalten:** Der Wirkstoff ist: 1 Lutschpastille enthält 30 mg Propolis (gepulvert). Die sonstigen Bestandteile sind: Isomalt, Levomenthol, Pfefferminzöl, Gereinigtes Wasser, Hochdisperses Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium.

1 Lutschpastille enthält Kohlenhydrate, entsprechend ca. 0,12 BE.

**Wie Propolis Halspastillen aussehen und Inhalt der Packung:** Propolis Halspastillen sind in Packungen mit 30 Lutschpastillen erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer:** Börner GmbH, Rockwinkeler Heerstraße 100, 28355 Bremen

**Hersteller:** roha arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstraße 100, 28355 Bremen

**Vertrieb:** Zirkulin Naturheilmittel GmbH, Rockwinkeler Heerstraße 90, 28355 Bremen

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2016**